


Pieczęć jednostki kierującej



📍 Żegańska 46A, 04-736 Warszawa

☎ (22) 613 05 10, (22) 812 13 89

✉ rejestracja@nukleomed.pl

Data wystawienia skierowania _____

Nazwa komórki organizacyjnej _____

Numer identyfikacyjny (UMOWY z NFZ) świadczeniodawcy _____

Skierowanie na badanie scyntygrafia przytarczyc MIBI

Dane Pacjenta

Imię i nazwisko Pacjenta _____

PESEL Pacjenta Waga Pacjenta _____ Wzrost Pacjenta _____

Adres Pacjenta _____

Nr telefonu Pacjenta _____ E-mail Pacjenta _____

Rozpoznanie _____ Kod ICD 10 _____

Rozpoznanie histopatologiczne _____

Opis problemu diagnostycznego _____

Dotychczasowe leczenie

Chirurgiczne

Nie leczony W trakcie Data zabiegu _____

Badania laboratoryjne

Poziom PTH

Wapń całkowity lub zjonizowane fosforany

Poziom witaminy D3

Dotychczas wykonane badania obrazowe

USG

Nie Tak Data badania _____

TK

Nie Tak Data badania _____

MR

Nie Tak Data badania _____

Sycyntygrafia

Nie Tak Data badania _____

PET/CT:

Nie Tak Data badania _____

Przypominamy o konieczności dołączenia opisów i zdjęć z wykonanych dotychczas badań obrazowych oraz kart informacyjnych z dotychczasowych hospitalizacji.

Inne uwagi _____

Telefon kontaktowy do lekarza kierującego _____

Wyrażam zgodę na wykorzystanie numeru telefonu _____
do kontaktów w związku z wykonywanym badaniem diagnostycznym. (Dobrowolne)

(podpis i pieczęć lekarza kierującego)

Przygotowanie Pacjenta, informacje o badaniu:

- W dniu badania nie trzeba być na czczo,
- Należy zabrać ze sobą aktualne wyniki badań dotyczące przytarczyc i tarczycy: wynik badania USG tarczycy, oznaczenie stężeń hormonów we krwi: PTH, TSH, poziom Ca,
- W przypadku suplementacji witaminy D3 należy odstawić preparat na około 4 tygodnie przed badaniem,
- Pacjentowi zostaje podany dożylnie znacznik izotopowy. Następnie odbywa się zapis obrazów na gamma-kamerze po 20 minutach i 2 godzinach od podania znacznika techniką SPECT. Badanie wykonywane jest w pozycji leżącej na plecach. każdy zapis trwa około 30 minut.
- W przypadku konieczności wykonania badania u kobiety karmiącej należy przewidzieć przerwę w karmieniu piersią 24 godziny.