


Pieczęć jednostki kierującej



Nukleomed sp. z o.o.

📍 Żegańska 46A, 04-736 Warszawa

☎ (22) 613 05 10, (22) 812 13 89

✉ rejestracja@nukleomed.pl

Data wystawienia skierowania _____

Nazwa komórki organizacyjnej _____

Numer identyfikacyjny (UMOWY z NFZ) świadczeniodawcy _____

Skierowanie na kwalifikację i leczenie - radiosynowektomia do kliniki NUKLEOMED

Dane Pacjenta

Imię i nazwisko Pacjenta _____

PESEL Pacjenta

Waga Pacjenta _____

Wzrost Pacjenta _____

Adres Pacjenta _____

Nr telefonu Pacjenta _____

E-mail Pacjenta _____

Rozpoznanie - Przewlekłe zapalenie stawu: _____

Kod ICD 10 _____

Cel badania - Radiosynowektomia stawu: _____

Dotychczasowy przebieg choroby: _____

Dotychczasowe leczenie

Chirurgiczne

Leczony

Nie leczony

Data zabiegu _____

Dotychczas wykonane badania

USG serca

Tak

Nie

Data badania _____

MR


Tak

Nie

Data badania _____

Przygotowanie Pacjenta, informacje o badaniu:

- Nie trzeba być na czczo
- Najlepiej ubrać się w luźną odzież zapewniającą łatwy dostęp do stawu
- Zabieg radiosynowektomii trwa około 20 minut. Nie wymaga znieczulenia ogólnego. Lek izotopowy, w odpowiednio indywidualnie dobranej dawce, podawany jest bezpośrednio do jamy stawowej. Miejsce wkłucia i podanie izotopu do stawu są monitorowane pod kontrolą usg. Bezpośrednio po podaniu radiofarmaceutyku, z tego samego wkłucia, dostawowo podawany jest lek sterydowy.
- Następnie staw jest bandażowany i zakładana jest orteza (pracownia Nukleomed dysponuje ortezami, które są wypożyczane pacjentom, nie ma więc potrzeby zakupu własnej ortozy). U pacjentów, u których leczone są stawy kolanowe po iniekcji dostawowej wykonywana jest iniekcja podskórna leku przeciwkrzepliwego.
- Nie należy zdejmować ortozy przed upływem 48 godzin – unieruchomienie stawu zapewnia odpowiednie rozmieszczenie leku izotopowego i zapobiega cofnięciu się izotopu poza miejsce wkłucia. Ma to zasadnicze znaczenie dla przebiegu leczenia!
- W ciągu pierwszych 7 dni od zabiegu należy ograniczyć do minimum obciążanie leczonego stawu
- Nie należy zażywać kąpeli w trakcie unieruchomienia stawu
- Wypożyczoną w trakcie zabiegu ortezę należy zwrócić/odebrać do przychodni Nukleomed w ciągu 7 dni od zabiegu po zabiegu pacjent nie może prowadzić pojazdów mechanicznych – należy zapewnić pacjentowi transport do domu
- W przypadku obrzęku po leczeniu należy zastosować zimny okład na staw, a w razie bólu zażyć lek przeciwbólowy
- Pacjent ma świadomość, że w leczonym stawie znajduje się krótkożyciowa substancja promieniotwórcza.
- W razie karmienia piersią, należy je zaprzestać całkowicie.
- Przez okres 4 miesięcy po podaniu izotopu należy unikać zajścia w ciążę.
- **W przypadku planowanego przekraczania stref dozorowanych (przejścia graniczne, lotniska, wejścia na perony) pacjent powinien zgłosić się do rejestracji w celu otrzymania zaświadczenia o podanej dawce diagnostycznej izotopu promieniotwórczego**



Żegańska 46A, 04-736 Warszawa

**Dojazd autobusami: 119, 125, 147, 525
przystanek na żądanie Bielszowicka**